# 良性前列腺增生经尿道前列腺 电切术临床路径

(2019年版)

#### 一、良性前列腺增生临床路径标准住院流程

#### (一) 适用对象

第一诊断为良性前列腺增生(ICD-10: N40)。

行经尿道前列腺电切术(TURP)(ICD-9-CM-3:60.2902)。

#### (二)诊断依据

根据《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》(中华医学会泌尿外科学分会编著,人民卫生出版社,2014年)。

- 1. 病史: IPSS、QOL 评分。
- 2. 体格检查。
- 3. 实验室检查及影像学检查。

# (三) 选择治疗方案的依据

根据《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》(中华医学会泌尿外科学分会编著,人民卫生出版社,2014年)。

- 1. 适合经尿道前列腺电切术 (TURP)。
- 2. 能够耐受手术。
  - (四)标准住院日为≤10天

# (五) 进入路径标准

1. 第一诊断必须符合 ICD-10: N40 良性前列腺增生疾病 编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

#### (六) 术前准备(术前评估) ≤3 天

必需的检查项目:

- 1. 血常规、尿常规:
- 2. 电解质、肝肾功能、血型、凝血功能;
- 3. 感染性疾病筛查(乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病、梅毒等);
  - 4. X 线胸片、心电图。

#### (七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

按照《抗菌药物临床应用指导原则》(国卫办医发〔2015〕 43号)执行,并结合患者的病情决定抗菌药物的选择与使用 时间。

#### (八) 手术日为入院第≤3天

- 1. 麻醉方式: 脊椎麻醉、硬膜外麻醉或全身麻醉。
- 2. 手术方式: 经尿道前列腺电切术 (TURP)。
- 3. 术中用药:麻醉用药,必要时用抗菌药物。
- 4. 输血: 必要时。

### (九) 术后住院恢复≤7天

1. 必须复查的检查项目: 血常规、尿常规; 根据患者病情变化可选择相应的检查项目。

2. 术后抗菌药物应用:按照《抗菌药物临床应用指导原则》(国卫办医发〔2015〕43号)执行。

#### (十) 出院标准

- 1. 一般情况良好。
- 2. 拔除尿管后,排尿通畅。
- 3. 耻骨上造瘘口无漏尿(如适用)。

#### (十一) 变异及原因分析

- 1. 术中、术后出现并发症,需要进一步诊治,导致住院时间延长、费用增加。
- 2. 术后出现排尿功能异常,需要进一步诊治,导致住院时间延长、费用增加。
- 3. 术后原伴随疾病控制不佳,需请相关科室会诊,进一步诊治。
- 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断,可进入其他路径。

# 二、良性前列腺增生临床路径表单

适用对象:第一诊断为良性前列腺增生(ICD-10: N40)

行经尿道前列腺电切术 (TURP) (ICD-9-CM-3: 60.2902)

	患者姓名:	性别:	年龄:_	门诊号:	住院号:	
	住院日期:年月日 出		出院日期:年月日		标准住院日: ≤10天	
时间	住院第 1~2 天		住院第3天		住院第 4~6 天 (术后第 1~3 天)	
主要诊疗工作	IPSS、QOL □ 安排相关档 □ 完成术前词 □ 术前讨论, □ 完成术前口 □ 完成术前页	查、汇总检查结果 估和术前准备 确定手术方案 站,相关查房记录 医属交代围术期注意 目情同意书、输血同	□ 术前预[□ 手术 □ 术后标 □ 术后向 病情及》	手术日) 防用抗菌药物 本送病理 患者及家属交代 主意事项 后病程记录及手	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	至房 已录 也活动,预防下肢
重点医嘱	□□ <b>临</b> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	是常规 电解质、血型 5筛查、凝血功能 心电图 性性抗原 5.+ 5.+ 5.+ 5.+ 5.+ 5.+ 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	□□□ <b>临</b> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	后恢复术前饮食 后恢复基础用药 (或)造瘘管接无 中洗 物 使用抑制膀胱痉 用止血药 使用抑酸剂	第 <b>K</b>	用抑制膀胱痉挛 二血药 月抑酸剂 尽常规 电解质
主要护理工作	□ 术后所带原	基备注意事项 是管及膀胱冲洗指导	项 □ 术后引注 □ 术后饮 <sup>*</sup> □ 术后活 <sup>‡</sup>		指导	文水指导 旨导 问题(膀胱痉挛)
病情 变异 记录	□无 □有,厕 1. 2.	<b>录因:</b>	│□无 □有 │1. │2.	,原因 <b>:</b>	□无 □有,〕 1. 2.	泉 <b>齿:</b>
护士 签名						
医师 签名						

时间	住院第 7~8 天	住院第 9~10 天		
ובין ניא	(术后第 4~5 天)	(出院日)		
主要诊疗工作	□ 观察病情 □ 拔除导尿管 □ 观察排尿情况 □ 完成病程记录	<ul> <li>□ 观察病情</li> <li>□ 观察排尿情况</li> <li>□ 上级医师查房</li> <li>□ 出院</li> <li>□ 向患者及家属交代出院后注意事项</li> <li>□ 完成出院病程记录</li> <li>□ 病理结果告知患者</li> </ul>		
重点医嘱	<ul><li>长期医嘱:</li><li>□ 口服抗菌药物</li><li>□ 必要时使用抑制膀胱痉挛药</li><li>□ 酌情拔尿管</li><li>临时医嘱:</li><li>□ 停输液及抗菌药物医嘱</li><li>□ 拔除导尿管</li></ul>	出院医嘱: □ 今日出院 □ 如果有耻骨上造瘘,伤口换药 □ 出院带药: 抗菌药物、抑制膀胱痉挛药(必要时)、基础药 □ 定期复查		
主要 护理 工作	□ 拔管后排尿问题护理指导 □ 饮食饮水指导 □ 活动指导	□ 指导患者办理出院 □ 出院后活动饮食指导 □ 用药指导 □ 嘱出现发热、血尿急诊就诊 □ 遵医嘱定期复查		
病情	□无 □有,原因:	□无 □有,原因:		
变异	1.	1.		
记录	2.	2.		
护士 签名				
医师				
签名				